

Số: /TB-TTĐVNN

Gia Lâm, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Sâu bệnh hại trên rau và biện pháp phòng trừ

Diện tích rau vụ xuân hè trên địa bàn huyện là 670,9 ha, chủ yếu là các loại rau họ cà, họ bầu bí, rau thập tự, rau dền, mồng tơi, rau muống... Thời tiết nắng nóng kéo dài là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Qua kiểm tra thăm đồng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Gia Lâm thông báo một số đối tượng dịch hại chính và biện pháp phòng trừ như sau:

I. Tình hình sinh vật gây hại chính.

- Bọ phấn trắng trên cà, bí, mướp: Tỷ lệ phổ biến từ 20- 25% cây, cao 35-40%, cục bộ > 40% cây .
- Rầy, rệp, bọ trĩ mướp, bí, cà, ớt: Tỷ lệ phổ biến từ 15- 17% cây, cao 27- 30%
- Bọ nhảy rau cải: Mật độ trung bình 7-10 con/2, cao 15-20 con/m², cục bộ > 25 con/m².
- Đóm mắt cua mồng tơi: Tỷ lệ 5- 7% cây, cao 10- 12%, cục bộ 20% cây.
- Ruồi đục quả mướp, bầu bí: Tỷ lệ phổ biến 0,5- 1%, cao 5- 6% quả.
- Giả sương mai mướp đắng, bầu, bí: Tỷ lệ phổ biến 1- 2% cây, cao 5- 7% cây.

II. Biện pháp phòng trừ.

1. Biện pháp thủ công: Thăm đồng thường xuyên, vệ sinh đồng ruộng, tía bỏ các lá già, lá bị bệnh; quả bị ruồi vàng gây hại thu gom đem tiêu huỷ tránh lây lan, giữ cho vườn luôn thông thoáng để hạn chế các nguồn tồn dư.

2. Biện pháp sinh học và hoá học.

- **Đối với côn trùng chích hút như bọ phấn trắng, bọ trĩ, rầy, rệp, bọ trĩ:** Sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh cho hiệu quả cao để bẫy trưởng thành. Phòng trừ khi tỷ lệ cây bị hại từ 15% cây trở lên bằng các loại thuốc có hoạt chất Spirotetrama, Chlorantraniliprole, Buproein, Diflubenzuron...như Movento 150OD, Voliam Targo 063SC, Applaud 25WP, Goodcheck 78WP...

- **Đối với đối tượng bọ nhảy:** Phòng trừ khi mật độ bọ nhảy từ 10 con/m² trở lên bằng các loại thuốc có hoạt chất Dinotefuran, Spinetoram, Pyridalyl... như Oshin 20WP, Radiant 60SC, Sumiple0 10EC,...

- **Đối với bệnh đóm mắt cua mồng tơi:** Phòng trừ khi tỷ lệ cây bị bệnh từ 5% cây trở bằng các loại thuốc có hoạt chất Mancozeb, Propiconazole,..như Fovathane 80WP, Supertim 300EC,...

- **Đối với ruồi đục quả trên mướp, bầu bí:** Sử dụng bẫy Methyl Eugenol (chất dẫn dụ ruồi đục) để diệt ruồi đục. Khi quả chưa chín, phát hiện tỷ lệ hại từ

2- 2,5% quả trở lên phun trừ bằng các thuốc có hoạt chất Spinosad, Abamectin + Bacillus thuringiensis... như: Susses 0.25SC, Tridan 21.8WP...

- **Đối với bệnh giả sương mai trên dưa chuột, mướp, bầu, bí:** Phòng trừ khi tỷ lệ cây bị bệnh từ 5% bằng các loại thuốc có hoạt chất Trifloxystrobin, Propineb, Azoxystrobin,... như Nativo 750WG, Antracol 70WP, Novista 360WP,...

Lưu ý: Khi phun thuốc bà con đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì. Sử dụng thuốc tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”, đảm bảo thời gian cách ly.

Trên đây là thông báo hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây rau vụ hè. Đề nghị UBND, HTXDVNN các xã, Thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ các đối tượng dịch hại kịp thời và hiệu quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Nơi nhận:

- Đ/c Trương Văn Học PCT phụ trách; (Đề b/c)
- Phòng Kinh tế huyện; (Đề b/c)
- UBND, HTXDVNN các xã; thị trấn; (Đề t/h)
- Trung tâm VH TT&TT (Tuyên truyền);
- Lưu VT.

P.GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Phương